



Enregistrement
relatif à la qualité

MU-ED1/002/11
Application : 13/07/2020

Fiche de renseignements cliniques - Recueils urinaires

Page : 1/ 1

INFORMATIONS

Nom :
Prénom :
Nom de naissance :
Date de naissance : ... / ... /
Adresse :
.....

Date du prélèvement : .../.../.....à ...h...
Mode de recueil :
 Echantillon 2^{ème} jet 1^{er} jet
 Urine de 24h
 Collecteur/poche
 Dérivation (Bricker) sonde JJ
 Sondage évacuateur Sondage à demeure

<input type="checkbox"/> ECBU	<input type="checkbox"/> Cytologie urinaire	<input type="checkbox"/> Bilharziose
Préconisations pour le recueil		
4 heures après la dernière miction. Se laver les mains Réaliser une toilette avec la lingette et éliminer le 1^{er} jet avant le recueil. Chez l'enfant, le sac collecteur ne doit pas être maintenu plus de 30min, à transporter dans le flacon stérile	Au lever, uriner dans les toilettes. Effectuer quelques exercices physiques après avoir bu un grand verre d'eau (marcher 20min ou monter/descendre des escaliers plusieurs fois). Réaliser une toilette locale et uriner ensuite directement dans le flacon sec	Echantillon : uriner la 1 ^{ère} miction dans le flacon ou à défaut après une activité physique. 24h : vider sa vessie au réveil. Noter l'heure, puis uriner les 24h suivantes dans le flacon (jour et nuit), uriner une dernière fois à 24h dans le flacon.
Acheminement au laboratoire		
Dans les 2 heures	Dans les 2 heures	Le plus rapidement possible du lundi au vendredi matin
Peut être conservé 24h au réfrigérateur	Peut être conservé 24h au réfrigérateur <i>Chaque échantillon doit être recueilli dans un flacon distinct</i>	
Contexte clinique		
<input type="checkbox"/> Brûlures mictionnelles <input type="checkbox"/> Difficultés à uriner <input type="checkbox"/> Mictions fréquentes <input type="checkbox"/> Fièvre <input type="checkbox"/> Douleurs lombaires <input type="checkbox"/> Grossesse (terme.....) <input type="checkbox"/> bilan avant geste urologique <input type="checkbox"/> Traitement antibiotique : En cours/ Prévu/Contrôle	<input type="checkbox"/> Dépistage <input type="checkbox"/> Lithiase <input type="checkbox"/> Hématurie <input type="checkbox"/> Infection urinaire <input type="checkbox"/> Hypertrophie prostatique <input type="checkbox"/> Tumeur de la vessie : <input type="checkbox"/> Suspectée <input type="checkbox"/> Traitée <input type="checkbox"/> Surveillée <input type="checkbox"/> Autre tumeur :	<input type="checkbox"/> Hématurie <input type="checkbox"/> Mictions fréquentes <input type="checkbox"/> Brûlures mictionnelles <input type="checkbox"/> Antécédents de bilharziose Séjour en zone d'endémie : <input type="checkbox"/> Afrique <input type="checkbox"/> Vallée du Nil <input type="checkbox"/> Madagascar <input type="checkbox"/> Moyen-Orient <input type="checkbox"/> Asie <input type="checkbox"/> Corse du sud (rivière CAVU) Baignade en eau douce : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non